

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5963, 14.8.2025
Αριθμός 251

Κ.Α.Π. 251/2025

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2017

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 14(3)

Προοίμιο.	Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2025/145 της Επιτροπής της 29 ^{ης} Ιανουαρίου 2025 για την τροποποίηση της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ όσον αφορά ορισμένους ενωσιακούς ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας, συγκεκριμένα τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού, τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το <i>Pucciniastrum minimum</i> (Schweinitz) Arthur και τον παθογόνο παράγοντα του μωσαικού της συκιάς, καθώς και διόρθωση της εν λόγω εκτελεστικής οδηγίας όσον αφορά τα μέτρα σχετικά με το <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider».
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L	
30.1.2025.	
149(Ι) του 2007 2(Ι) του 2011 70(Ι) του 2017.	Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει η παράγραφος (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 14 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.
Συνοπτικός τίτλος.	1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2025 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων Κανονισμούς και Διάταγμα του 2011 έως 2023 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «το βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων Διατάγματα του 2011 έως 2025.
Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 9.2.2011 23.06.2017 10.7.2020 13.11.2020 18.12.2020 3.11.2023 1.12.2023.	
Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του βασικού διατάγματος.	2. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού διατάγματος τροποποιείται ως ακολούθως- (α) Με την διαγραφή των φράσεων «Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα» και «Παθογόνος παράγοντας του μωσαικού της συκιάς [FGM000] από τη δεύτερη στήλη αυτού στην καταχώρηση « <i>Ficus carica</i> L.»» (β) με τη προσθήκη στην κατηγορία «Μύκητες και ωομύκητες» της φράσης « <i>Pucciniastrum minimum</i> Sydow & P. Sydow [THEKMI]» στη δεύτερη στήλη αυτού στην καταχώρηση « <i>Vaccinium</i> L.».
Αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ του βασικού διατάγματος.	3. Το βασικό διάταγμα τροποποιείται με την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ με το ακόλουθο Παράρτημα-

«Παράρτημα III

(Κανονισμοί 2, 5ΣΤ, 5Ζ, 5ΙΓ, 5ΙΗ και 5Ν)

Κατάλογος των ΡΕΟΜΚ για την παρουσία των οποίων απαιτείται οπτική επιθεώρηση και κατά περίπτωση δειγματοληψία και δοκιμές σύμφωνα με τις παραγράφους (2) και (4) του Κανονισμού 5ΣΤ, την παράγραφο (1) του Κανονισμού 5Ζ, την παράγραφο (1) του Κανονισμού 5ΙΓ, την παράγραφο (1) του Κανονισμού 5ΙΗ και τις παραγράφους (1) και (4) του Κανονισμού 5Ν

Γέννη ή είδη	ΡΕΟΜΚ
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Μύκητες και ωομύκητες <i>Phytophthora ramorum</i> (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle και <i>Poncirus</i> Raf.	Βακτήρια <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI] Μύκητες και ωομύκητες <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Παθογόνος παράγοντας της κριστάκορτης των εσπεριδοειδών [CSCC00] Ιοειδές της εξώκορτης των εσπεριδοειδών [CEVD00] Παθογόνος παράγοντας της λιθίασης των εσπεριδοειδών [CSI000] Ιός της κηλίδωσης των φύλλων των εσπεριδοειδών [CLBV00] Ιός της ψύρωσης των εσπεριδοειδών [CPSV00] Ιός της τριστήσας των εσπεριδοειδών (στελέχη απομονωθέντα στην ΕΕ) [CTV000] Ιός της ποικιλοχλώρωσης των εσπεριδοειδών [CVV000] Ιοειδές του νανισμού του λυκίσκου [HSVD00]
<i>Corylus avellana</i> L.	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00]
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Παθογόνος παράγοντας του ελαστικού ξύλου της μηλιάς [ARW000] Ιός του βοστρυχοειδούς ξύλου της μηλιάς [ASGV00] Ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς [ASPV00] Παθογόνος παράγοντας της νέκρωσης του φλοιού της αχλαδιάς [PRBN00] Παθογόνος παράγοντας του σχισίματος του φλοιού της αχλαδιάς [PRBS00] Ιοειδές του εξανθηματικού έλκους της αχλαδιάς [PBCVD0] Παθογόνος παράγοντας του τραχέος φλοιού της αχλαδιάς [PRRB00] Παθογόνος παράγοντας της κίτρινης κηλίδωσης της κυδωνιάς [ARW000]
<i>Fragaria</i> L.	Βακτήρια

	<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR] Μύκητες και ωομύκητες <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC] <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] <i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR] Νηματώδεις <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE] <i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL] <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhner [APLORI] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0] Ιός της ρυτίδωσης της φράουλας [SCRV00] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0] Ιός του ήπιου περιφερειακού κιτρινίσματος της φράουλας [SMYEV0] Ιός της ποικιλοχλώρωσης της φράουλας [SMOV00] Ιός της ταινίωσης των νεύρων της φράουλας [SVBV00] Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00]
<i>Juglans regia</i> L.	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της κερασιάς [CLRV00]
<i>Malus</i> Mill.	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιοειδές των βοθρίων των μήλων [ADFVD0] Παθογόνος παράγοντας των επίπεδων κλάδων της μηλιάς [AFL000] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Παθογόνος παράγοντας του ελαστικού ξύλου της μηλιάς [ARW000] Ιοειδές της εσχάρωσης του φλοιού των μήλων [ASSVD0] Παθογόνος παράγοντας των αστεροειδών ρωγμών των μήλων [APHW00] Ιός του βοστρυχοειδούς ξύλου της μηλιάς [ASGV00] Ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς [ASPV00] <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPMA] Αλλοιώσεις των καρπών: ατροφικοί καρποί [APCF00], πράσινοι ρυτιδωμένοι καρποί [APGC00], καρποί με εξογκώματα (Ben Davis), τραχύς φλοιός [APRSK0], αστεροειδείς ρωγμές, καστανέρυθροι δακτύλιοι [APLP00], καστανέρυθρα οζίδια Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
<i>Olea europaea</i> L.	Μύκητες και ωομύκητες <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]

	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] Ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της κερασιάς [CLRV00] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]
<i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb	Βακτήρια <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Βακτήρια <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Λανθάνων ιός της βερικοκιάς [ALV000] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
<i>Prunus avium</i> L. και <i>Prunus cerasus</i> L.	Βακτήρια <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ιός της πράσινης δακτυλιωτής ποικιλοχλώρωσης των φύλλων της κερασιάς [CGRMV0] Ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της κερασιάς [CLRV00] Ιός της ποικιλοχλώρωσης των φύλλων της κερασιάς [CMLV00] Ιός της σκωριόχρου νεκρωτικής ποικιλοχλώρωσης της κερασιάς [CRNRM0]

	Ιός 1 και 2 της μικροκαρπίας της κερασιάς [LCHV10], [LCHV20] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0] Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley και άλλα είδη <i>Prunus</i> L. ευπαθή στον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς στην περίπτωση των υβριδίων <i>Prunus</i> L.	Βακτήρια <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της μυροβαλάνου [MLRSV0] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Βακτήρια <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Λανθάνων ιός της βερικοκιάς [ALV000] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς [PLMVD0] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
<i>Pyrus</i> L.	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Παθογόνος παράγοντας του ελαστικού ξύλου της μηλιάς [ARW000] Ιός του βοστρυχοειδούς ξύλου της μηλιάς [ASGV00] Ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς [ASPV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

	Παθογόνος παράγοντας της νέκρωσης του φλοιού της αχλαδιάς [PRBN00] Παθογόνος παράγοντας του σχισίματος του φλοιού της αχλαδιάς [PRBS00] Ιοειδές του εξανθηματικού έλκους της αχλαδιάς [PBCVD0] Παθογόνος παράγοντας του τραχέος φλοιού της αχλαδιάς [PRRB00] Παθογόνος παράγοντας της κίτρινης κηλίδωσης της κυδωνιάς [ARW000]
Ribes L.	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] Ιός της αναστροφής του μαύρου φραγκοστάφυλου [BRAV00] Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς [CMV000] Ιός σχετιζόμενος με την ταινίωση των νεύρων του πράσινου φραγκοστάφυλου [GOVB00] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]
Rubus L.	Μύκητες και ωομύκητες <i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] Ιός της νέκρωσης του μαύρου σμέουρου [BRNV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU] Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς [CMV000] Ιός του θαμνώδους νανισμού του σμέουρου [RBDV00] Ιός της ποικιλοχλώρωσης των φύλλων του σμέουρου [RLMV00] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0] Ιός της χλώρωσης των νεύρων του σμέουρου [RVCV00] Κίτρινη κηλίδωση του σμέουρου [RYS000] Ιός του κίτρινου διχτυού της βατομουριάς [RYNV00] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0] Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
Vaccinium L.	Μύκητες και ωομύκητες <i>Phytophthora ramorum</i> (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός σχετιζόμενος με το μωσαϊκό του μύρτιλου (γένος orphiovirus) [BLMAV0] Ιός της κόκκινης δακτυλιωτής κηλίδωσης του μύρτιλου [BRRV00] Ιός του εγκαύματος του μύρτιλου [BLSCV0] Ιός της καταπληξίας του μύρτιλου [BLSHV0]

	Ιός της νημάτωσης του μύρτιλου [BSSV00] <i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> Lee et al. [PHYPAS] <i>Candidatus Phytoplasma pruni</i> [PHYPPN] <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al. [PHYPSO] Φυτόπλασμα των ανώμαλων ανθέων του κρίνου/οξύκοκκου [PHYFPB] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού [TRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]».
--	--

Τροποποίηση
του
Παραρτήματος
V του βασικού
διατάγματος.

4. Το Παράρτημα V του βασικού διατάγματος τροποποιείται ως ακολούθως-

(α) με την αντικατάσταση του σημείου 8 αυτού με το ακόλουθο νέο σημείο-

«8. *Malus Mill.*

α) Όλες οι κατηγορίες

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

β) Κατηγορία προβασικού υλικού

Δειγματοληψία και δοκιμές

Κάθε προβασικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές δεκαπέντε έτη μετά την αποδοχή του ως προβασικού μητρικού φυτού και, εν συνεχεία, ανά δεκαπέντε έτη σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ, εκτός από τις ασθένειες που είναι παρεμφερείς με τις ιογενείς και τα ιοειδή που απαριθμούνται στο παράρτημα III, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

Σε περίπτωση που επιτρέπεται παρέκκλιση για την παραγωγή προβασικού υλικού σε αγρούς σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν την προστασία από έντομα, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/925 της Επιτροπής, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις για τον *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, τον *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. και τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας:

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. ή
- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής έχουν επιθεωρηθεί κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα του *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

iii) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

γ) Κατηγορία βασικού υλικού

Δειγματοληψία και δοκιμές

Στην περίπτωση βασικών μητρικών φυτών που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

Στην περίπτωση βασικών μητρικών φυτών που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε τρία έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider. Αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία PEOMK, πλην του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider και εκτός από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, τις ασθένειες που είναι παρεμφερείς με τις ιογενείς και τα ιοειδή που απαριθμούνται στο παράρτημα III, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

Τα βασικά μητρικά φυτά υποβάλλονται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε είκοσι έτη σχετικά με την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως·

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.: ή
- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής επιθεωρούνται κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.

iii) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν

συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

δ) Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού

Δειγματοληψία και δοκιμές

Στην περίπτωση πιστοποιημένων μητρικών φυτών που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

Στην περίπτωση πιστοποιημένων μητρικών φυτών που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε πέντε έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider. Αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία PEOMK, πλην του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider και εκτός από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, τις ασθένειες που είναι παρεμφερείς με τις ιογενείς και τα ιοειδή που απαριθμούνται στο παράρτημα III, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

Τα πιστοποιημένα μητρικά φυτά υποβάλλονται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε είκοσι έτη σχετικά με την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Τα πιστοποιημένα οπωροφόρα φυτά υποβάλλονται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως· ή
- παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider·

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.· ή
- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής επιθεωρούνται κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.

iii) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

ε) Κατηγορία υλικού CAC

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider·

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.· ή
- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής έχουν επιθεωρηθεί κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

iii) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ToRSV σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και τα

φυτά αυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.»

(β) με την αντικατάσταση του σημείου 11 αυτού με το ακόλουθο νέο σημείο-

«11. *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch και *Prunus salicina* Lindley

α) Κατηγορία προβασιικού υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Οπτικές επιθεωρήσεις διενεργούνται δύο φορές ετησίως σε σχέση με τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, τον *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. και τον *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch και *Prunus salicina* Lindley). Οπτικές επιθεωρήσεις διενεργούνται ετησίως για όλους τους ΡΕΟΜΚ, εκτός από τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, τον *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. και τον *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού των ειδών *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. και *Prunus dulcis* (Miller) Webb προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς.

Τα προβασιικά έρριζα υποκείμενα των ειδών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς. Τα προβασιικά έρριζα υποκείμενα των ειδών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές κατά τις προηγούμενες πέντε καλλιεργητικές περιόδους και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Κάθε προβασιικό μητρικό φυτό σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηλιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων ένα έτος μετά την αποδοχή του ως προβασιικού μητρικού φυτού και στη συνέχεια ανά διαστήματα ενός έτους. Στην περίπτωση του *Prunus persica*, κάθε προβασιικό μητρικό φυτό σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία ένα έτος μετά την αποδοχή του ως προβασιικού μητρικού φυτού και υποβάλλεται σε δοκιμές για το ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς.

Κάθε δένδρο που έχει φυτευτεί σκόπιμα για επικοινωνία και, όπου είναι απαραίτητο, τα κύρια δένδρα επικοινωνίας στο περιβάλλον υποβάλλονται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηλιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων.

Κάθε προβασιικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία πέντε έτη μετά την αποδοχή του ως προβασιικού μητρικού φυτού, και στη συνέχεια ανά διαστήματα πέντε ετών, και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider και για τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς.

Κάθε προβασιικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία δέκα έτη μετά την αποδοχή του ως προβασιικού μητρικού φυτού, και μετέπειτα κάθε δέκα έτη, και υποβάλλεται και σε δοκιμές για τους ΡΕΟΜΚ, εκτός από τον ιό του νανισμού της δαμασκηλιάς, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς και τον ιό της νεκρωτικής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων, που προσβάλλουν τα συγκεκριμένα είδη, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα III, και υποβάλλεται σε δοκιμές στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα II. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των προβασιικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

Σε περίπτωση που επιτρέπεται παρέκκλιση για την παραγωγή προβασιικού υλικού σε αγρούς σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν την προστασία από έντομα, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/925 της Επιτροπής, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις για τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, τον *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. και τον *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie και τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας:

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως ή
- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής είναι απομονωμένα από άλλα φυτά-ξενιστές. Η απόσταση απομόνωσης της μονάδας παραγωγής εξαρτάται από τις περιφερειακές συνθήκες, το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού, την παρουσία *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider στην οικεία περιοχή και τους σχετικούς κινδύνους, όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν επιθεώρησης.

ii) Ιός της ευλογιάς της δαμασκηλιάς:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως ή
- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής είναι απομονωμένα από άλλα φυτά-ξενιστές. Η απόσταση απομόνωσης της μονάδας παραγωγής εξαρτάται από τις περιφερειακές συνθήκες, το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού, την παρουσία του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς στην οικεία περιοχή και τους σχετικούς κινδύνους, όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν επιθεώρησης.

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

iv) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον

ToRSV· ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

β) Κατηγορίες βασικού υλικού, πιστοποιημένου υλικού και υλικού CAC

Οπτική επιθεώρηση

Η οπτική επιθεώρηση πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος.

γ) Κατηγορία βασικού υλικού

Δειγματοληψία και δοκιμές

i) Μητρικά φυτά που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε τρία έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του ιού του νανισμού της δαμασκηλιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε δέκα χρόνια και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Μητρικά φυτά που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών, εκτός εκείνων που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων, υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, κατά τρόπο τέτοιο ώστε όλα τα φυτά να έχουν εξεταστεί εντός διαστήματος δέκα ετών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές σχετικά με την παρουσία του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, και έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω PEOMK.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών του *Prunus domestica* L. που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων πρέπει να υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κατά τις πέντε προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους όσον αφορά την παρουσία *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider και να έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω PEOMK.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε είκοσι έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών όσον αφορά την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δέκα έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία PEOMK, πλην του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, του ιού του νανισμού της δαμασκηλιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των

πυρηνόκαρπων, του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας που απαριθμούνται στο παράρτημα III, και υποβάλλεται σε δοκιμές στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία των PEOMK που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

– Μητρικά φυτά σε στάδιο ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό του νανισμού της δαμασκηνιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

Στην περίπτωση του *Prunus persica* (L.) Batsch, αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για το ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των δένδρων που φυτεύονται με σκοπό την επικονίαση και, όπου είναι απαραίτητο, τα κύρια δένδρα επικονίασης στο περιβάλλον υποβάλλονται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηνιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

– Μητρικά φυτά εκτός σταδίου ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών εκτός σταδίου ανθοφορίας που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές κάθε τρία χρόνια σχετικά με την παρουσία του ιού του νανισμού της δαμασκηνιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

δ) Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού

Δειγματοληψία και δοκιμές

i) Μητρικά φυτά που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε πέντε έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του ιού του νανισμού της δαμασκηνιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, ώστε όλα τα φυτά να υποβληθούν σε δοκιμές εντός διαστήματος δεκαπέντε ετών. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε δεκαπέντε χρόνια και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Μητρικά φυτά που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε τρία έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, κατά τρόπο τέτοιο ώστε όλα τα φυτά να έχουν εξεταστεί εντός διαστήματος δεκαπέντε ετών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές σχετικά με την παρουσία του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, και έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω PEOMK. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών των γενών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων έχει υποβληθεί σε δειγματοληψία και δοκιμές κατά τις πέντε προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους όσον αφορά την παρουσία *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω PEOMK.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε είκοσι έτη και σε δοκιμές βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών όσον αφορά την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, του ιού του νανισμού της δαμασκηιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηιάς, που απαριθμούνται στο παράρτημα II, και υποβάλλεται σε δοκιμές στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία των ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

– Μητρικά φυτά σε στάδιο ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό του νανισμού της δαμασκηιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών. Στην περίπτωση του *Prunus persica* (L.) Batsch, αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για το ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των δένδρων που φυτεύονται με σκοπό την επικοινωνία και, όπου είναι απαραίτητο, τα κύρια δένδρα επικοινωνίας στο περιβάλλον υποβάλλονται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

– Μητρικά φυτά εκτός σταδίου ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών εκτός σταδίου ανθοφορίας που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε τρία έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές για την παρουσία του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, του ιού του νανισμού της δαμασκηιάς και του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

ε) Κατηγορίες βασικού και πιστοποιημένου υλικού

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως ή
- συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider

ii) Ιός της ευλογιάς της δαμασκηιάς:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς·

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

iv) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των

οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

στ) Κατηγορία υλικού CAC

Δειγματοληψία και δοκιμές

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC προέρχονται από αναγνωρισμένη πηγή υλικού, από την οποία αντιπροσωπευτικό τμήμα έχει υποβληθεί σε δειγματοληψία και δοκιμές κατά τις τρεις προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

Τα έρριζα υποκείμενα κατηγορίας υλικού CAC των ειδών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. προέρχονται από αναγνωρισμένη πηγή υλικού, από την οποία αντιπροσωπευτικό τμήμα έχει υποβληθεί σε δειγματοληψία και δοκιμές κατά τα τελευταία 5 έτη και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider και τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των οπωροφόρων φυτών CAC που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς κατά την οπτική επιθεώρηση υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές με βάση εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης των οπωροφόρων φυτών αυτών όσον αφορά την παρουσία του εν λόγω PEOMK και στην περίπτωση ύπαρξης φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον.

Εάν εντοπιστεί πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC που παρουσιάζουν συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider στη μονάδα παραγωγής μέσω οπτικής επιθεώρησης, αντιπροσωπευτικό τμήμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC των παρτίδων στις οποίες εντοπίστηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σχετικά με την παρουσία *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία PEOMK, πλην του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider·

ii) Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς σε πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των σπυροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και σπυροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς·

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και σπυροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

iv) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ToRSV σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και σπυροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και τα φυτά αυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των

οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.»

(γ) με την αντικατάσταση του σημείου 14 αυτού με το ακόλουθο νέο σημείο-

«14. Rubus L.

α) Κατηγορία προβασικού υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Κάθε προβασικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές δύο έτη μετά την αποδοχή του ως προβασικού μητρικού φυτού, και μετέπειτα κάθε δύο έτη για την παρουσία των ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα II, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τους ιούς που απαριθμούνται στο παράρτημα III για το γένος *Rubus* L.: ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ιών που απαριθμούνται στο παράρτημα III για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως

β) Κατηγορία βασικού υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Όταν το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά καλλιεργούνται στον αγρό ή σε δοχεία, πραγματοποιούνται οπτικές επιθεωρήσεις δύο φορές ανά έτος.

Για το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παράγονται από μικροπολλαπλασιασμό και διατηρούνται για περίοδο μικρότερη των τριών μηνών, είναι αναγκαία μόνο μία οπτική επιθεώρηση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον κατά την οπτική επιθεώρηση υπάρχει ασάφεια ως προς την παρουσία συμπτωμάτων του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας. Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, οι οποίοι απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

- (i) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής για πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το οικείο πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.
- (ii) Απαιτήσεις για ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής

κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας:

Το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους ΡΕΟΜΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- το 0,1 % στην περίπτωση:

των *Agrobacterium* spp. Conn⁺ και

του *Rhodococcus fascians* Tilford⁺ και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν⁺

(iii) Απαιτήσεις για όλους τους ιούς:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τους ιούς που απαριθμούνται στο παράρτημα II για το γένος *Rubus* L.⁺ ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως⁺ ή
- συμπτώματα όλων των ιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και III παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 0,25 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

γ) Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον κατά την οπτική επιθεώρηση υπάρχει ασάφεια ως προς την παρουσία συμπτωμάτων του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας. Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, οι οποίοι απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

- (i) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής για πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το οικείο πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως⁺
- (ii) Απαιτήσεις για ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας:

Το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους ΡΕΟΜΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει:

– το 0,5 % στην περίπτωση του *Resseliella theobaldi* Barnes·

– το 0,1 % στην περίπτωση:

των *Agrobacterium* spp. Conn· και

του *Rhodococcus fascians* Tilford· και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν·

(iii) Απαιτήσεις για όλους τους ιούς:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τους ιούς που απαριθμούνται στο παράρτημα II για το γένος *Rubus* L.· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- συμπτώματα όλων των ιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 0,5 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

δ) Κατηγορία υλικού CAC

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον κατά την οπτική επιθεώρηση υπάρχει ασάφεια ως προς την παρουσία συμπτωμάτων του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας. Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, οι οποίοι απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τους ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II για το γένος *Rubus* L.· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο· και
- σε περίπτωση συμπτωμάτων του ToRSV, τα εν λόγω συμπτώματα παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και τα φυτά αυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και

καταστράφηκαν αμέσως· και

- σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής για πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το οικείο πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.»·

(δ) με την αντικατάσταση του σημείου 15 αυτού με το ακόλουθο νέο σημείο-

«15. Vaccinium L.

α) Κατηγορία προβασικού υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Κάθε προβασικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές πέντε έτη μετά την αποδοχή του ως προβασικού μητρικού φυτού, και μετέπειτα κάθε πέντε έτη για την παρουσία των PEOMK που απαριθμούνται στο παράρτημα III και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

β) Κατηγορία βασικού υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn στη μονάδα παραγωγής κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους καλλιεργητικής περιόδου.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Diaporthe vaccinii* Shear· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Diaporthe vaccinii* Shear στη μονάδα παραγωγής κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους καλλιεργητικής περιόδου·

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin και *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Toxospora myrtilli*) Peck

- το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους PEOMK δεν πρέπει να υπερβαίνει:
- το 0,1 % στην περίπτωση του *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Toxospora myrtilli*) Peck·
- το 0,5 % στην περίπτωση του *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin· και το εν λόγω

πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν.

iv) *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτούγειονομικά μέτρα· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο.

v) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού (TRSV) και ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV)

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον TRSV και τον ToRSV· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα TRSV ή ToRSV στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

γ) Κατηγορίες πιστοποιημένου υλικού και υλικού CAC

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία PEOMK που απεικονίζονται στα παραρτήματα II και III.

δ) Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin και *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Topospora myrtilli*) Peck

- το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους PEOMK δεν πρέπει να υπερβαίνει:
 - το 0,5 % στην περίπτωση:
 - του *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn·
 - του *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Topospora myrtilli*) Peck·
 - το 1 % στην περίπτωση του *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Wortonin· και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Diaporthe vaccinii* Shear· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Diaporthe vaccinii* Shear στη μονάδα παραγωγής κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους καλλιεργητικής περιόδου·

iii) *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτούγειονομικά μέτρα· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο·

ή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού που παρουσιάζουν συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld στη μονάδα παραγωγής και όλα τα φυτά σε ακτίνα 2 μέτρων από το συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα συμπτωματικά οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται, συμπεριλαμβανομένου του προσκολλημένου εδάφους·

και

- για όλα τα φυτά που βρίσκονται σε ακτίνα 10 m από συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και συμπτωματικά οπωροφόρα φυτά και κάθε εναπομένον πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρο φυτό από την προσβεβλημένη παρτίδα:
- εντός τριών μηνών από την ανίχνευση συμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και συμπτωματικών οπωροφόρων φυτών, δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και κατά τη διάρκεια της εν λόγω τρίμηνης περιόδου δεν πραγματοποιούνται επεξεργασίες που καταστέλλουν τα συμπτώματα του *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld· και
- μετά την εν λόγω τρίμηνη περίοδο:
 - δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής· ή
 - αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω οπωροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld·

και

- για κάθε άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό και τα άλλα οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής:
 - δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής· ή
 - αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω οπωροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

iv) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού (TRSV) και ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV)

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον TRSV και τον

ToRSV· ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα TRSV ή ToRSV στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

ε) Κατηγορία υλικού CAC

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην EE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην EE) Werres, De Cock & Man in 't Veld σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην EE) Werres, De Cock & Man in 't Veld σε πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο·

ή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC που παρουσιάζουν συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην EE) Werres, De Cock & Man in 't Veld στη μονάδα παραγωγής και όλα τα φυτά σε ακτίνα 2 μέτρων από το συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα συμπτωματικά σπυροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται, συμπεριλαμβανομένου του προσκολλημένου εδάφους· και
- για όλα τα φυτά που βρίσκονται σε ακτίνα 10 m από συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και συμπτωματικά σπυροφόρα φυτά και κάθε εναπομένον πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρο φυτό από την προσβεβλημένη παρτίδα:
- εντός τριών μηνών από την ανίχνευση συμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και συμπτωματικών σπυροφόρων φυτών, δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην EE) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω σπυροφόρα φυτά σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και κατά τη διάρκεια της εν λόγω τριμήνης περιόδου δεν πραγματοποιούνται επεξεργασίες που καταστέλλουν τα συμπτώματα του *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην EE) Werres, De Cock & Man in 't Veld· και μετά την εν λόγω τριμήνη περίοδο:
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην EE) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω σπυροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής· ή
- αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω σπυροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην EE) Werres, De Cock & Man in 't Veld·

και

- για κάθε άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό και τα άλλα σπυροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής:
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην EE) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω σπυροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής· ή
- αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω σπυροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην EE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

ii) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού (TRSV) και ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV)

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον TRSV και τον ToRSV· ή
- δεν παρατηρούνται συμπτώματα TRSV ή ToRSV στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή
- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του TRSV και του ToRSV σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και τα φυτά αυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως».

Δρ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος.